

PAKKAUSSELOSTE

Kesium® 40 mg / 10 mg purutabletit kissalle ja koiralle

Kesium® 50 mg / 12,5 mg purutabletit kissalle ja koiralle

Kesium® 400 mg / 100 mg purutabletit koiralle

ELÄNLÄÄKKEEN NIMI

Kesium 40 mg / 10 mg purutabletit
kissalle ja koiralle.

Kesium 50 mg / 12,5 mg purutabletit
kissalle ja koiralle.

Kesium 400 mg / 100 mg purutabletit koiralle.

KOOSTUMUS

Yksi tabletti sisältää:

Vaikuttavat aineet:

Amoksisilliini.....40,00 mg, 50 mg tai 400 mg
(amoksisilliiniriividraattina)

Klavalanaanhappo.....10,00 mg, 12,5 mg tai 100 mg
(kaliumklavalanaattina)

Pitkänomaisen, jakourrettu, beige purutabletti.
Tabletti voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osaan.

KOHDE-ELÄINLAJIT

40 mg / 10 mg ja 50 mg / 12,5 mg: kissa ja koira.
400 mg / 100 mg: koira.

KÄYTTÖAIHEET

Seuraavien infektioiden hoitoon, kun aiheuttajana on amoksisilliini ja klavalanaanhapon yhdistelmälle herkkä, beetalaktamaasia tuottava bakterikanta ja kun eläinlääke on kliinisen kokemuksen ja/tai herkkyysmäärityksen mukaan ensisijaislääke:

- Ihoinfektiot (myös pinnallinen ja syvä märkäinen ihotulehdus), kun taudin aiheuttaja on *Staphylococcus* spp.

- Virtsatieluehdukset, kun taudin aiheuttaja on *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli* tai *Proteus mirabilis*.

- Hengitystieinfektiot, kun taudin aiheuttaja on *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp tai *Pasteurella* spp.

- Ruoansulatuskanavan infektiot, kun taudin aiheuttaja on *Escherichia coli*.

- Suontelontalon (limakalvon) infektiot, kun taudin aiheuttaja on *Pasteurella* spp, *Streptococcus* spp tai *Escherichia coli*

VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliinille, mille beetalaktamaasille tai apuaineille. Ei saa käyttää eläimillä, joilla on vaikea munuaisesta vajaatoiminta ja virtsaantomuus tai vähvirtsaisuus. Ei saa käyttää gerbilillä, marsuilla, hamstereilla, kaniineilla eikä chinchilloilla. Ei saa käyttää hevosilla eikä märehöijillä. Ei saa käyttää tilanteissa, joissa tiedetään olevan resistenssi kyseiselle yhdistelmälle.

ERITYISVAROITUKSET

Erityiset varoitimet, jotka liittyvät

turvalliseen käyttöön kohde-eläinlajilla:

Laajakirjoisia antibioottihoitoja koskevat viranomaisohjeet, alueelliset ja kansalliset ohjeet on otettava huomioon. Älä käytä tapauksissa, joissa aiheuttajabakteeri on herkkä kapeakirjoisille penisilliinille tai pelkälle amoksisilliinille. Asianmukaista herkkyysmääritystä suositellaan hoitoa aloitettaessa, ja hoidon jatkamista suositellaan vain, kun taudinaiheuttajan herkkyys yhdistelmälle on varmistettu.

Valmisteyhteenvendon ohjeista poikkeava käyttö saattaa johtaa amoksisilliini ja klavalanaatin yhdistelmälle resistenttien bakteerien esiintyvyyden lisääntymiseen ja heikentää muiden beetalaktamiantibioottien tehoa. Maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa annostus on arviotava huolellisesti, ja eläinlääkkeen käyttöön on perustuttava eläinlääkärin tekemään hyöty-riskiarviointiin.

Muiden kuin kohdassa Vasta-aiheet mainittujen pienten kasvisryöjien hoidossa on noudatettava varovaisuutta. Muiden penisilliinihojondanusten tai kefalosporiinin käyttöön liittyvien allergisten ristireaktioiden mahdollisuus on otettava huomioon. Purutabletit sisältävät makuaineita. Jotta eläimet eivät vahingossa syö tabletteja, on ne säilytettävä eläinten ulottumattomissa.

Erityiset varoitimet, joita eläinlääkettä eläimille antavan henkilön on noudatettava:

Penisilliiniin ja kefalosporiinien itseensä pistäminen, hengittäminen, ottaminen suun kautta tai

joutuminen iholle voi aiheuttaa yliherkkyyttä (allergiaa). Yliherkkyys penisilliinille voi aiheuttaa ristireaktioiden kefalosporiineille ja päinvastoin. Näiden aineiden aiheuttamat allergiset reaktiot voivat joskus olla vakavia.

Älä käsittele tätä valmistetta, jos tiedät olevasi herkistynyt sille tai jos sinua on kehoitettu välttämään tällaisten valmisteluiden käsitelyä. Käsittele valmistetta hyvin varovaisesti, jotta et altistuisi sille, ja huolehdi kaikista suositelluista varotoimista. Jos sinulle kehittyy altistuksen jälkeen oireita, esimerkiksi ihottumaa, käänny lääkäriin puoleen ja näytä hänelle tämä varoitus. Kasvojen, huulten tai silmien alueen turvotus tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita ja vaativat kiireellistä lääkärihoitoa. Pese kädet käytön jälkeen.

Tiineys ja laktatio:

Laboratoriotutkimuksissa rotalla ja hiirellä ei ole löydetty näyttöä epämuodostumia aiheuttavista, sikiötoksista tai emälle toksisista vaikutuksista. Tiineyden ja imetyksen aikana valmistetta voidaan käyttää ainoastaan hoitavan eläinlääkärin hyöty-riskiarvion perusteella.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Kloramfenikoli, makrolidit, sulfonamidit ja tetra-sykliinit saattavat estää penisilliinien antibakteerisen vaikutuksen, sillä niiden bakteriostaattinen vaikutus alkaa nopeasti. Penisilliini saattavat voimistaa aminoglykosidien vaikutusta.

Yliannostus:

Yliannostustapauksessa saattaa esiintyä ripulia, allergisia reaktioita tai muita oireita kuten keskushermoston kiihottumisoireita tai kouristuksia. Oireenmukainen hoito aloitetaan tarvittaessa.

HAITATAPAHUUMAT

Luok. kissa:

Hyvin harvinainen (< 1 eläin 10 000 hoidetusta eläimestä, yksittäiset ilmoitukset mukaan luettuina):
Ruoansulatuskanavan oireita (ripulia ja oksentelua) ¹
Allergisia reaktioita (ihoreaktioita, anafylaksia) ²

¹Hoito voidaan lopettaa haittavaikutusten vaikeasteen ja eläinlääkärin tekemään hyöty-riskiarviointin perusteella.

² Näissä tapauksissa valmisteen käyttö on lopetettava ja annettava oireenmukaista hoitoa.

Haittatapahtumista ilmoittaminen on tärkeää. Se mahdollistaa eläinlääkkeen turvallisuuden jatkuvan seurannan. Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä, ettei läke ei ole tehonnut, ilmoita ensisijaisesti asiasta eläinlääkärillesi. Voit ilmoittaa kaikista haittavaikutuksista myös myyntiluvan haltijalle tai myyntiluvan haltijan paikalliselle edustajalle käyttämällä tämän pakkausselosteen lopussa olevia yhteystietoja tai kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. www-sivusto: <https://www.fimea.fi/elainlaakkeet/>

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT

KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Suun kautta. Suositusannos koirille ja kissoilta on 10 mg amoksisilliiniä / 2,5 mg klavalanaanhappoa painokiloa kohti kahdesti vuorokaudessa suun kautta, eli **40 mg/10 mg**: 1 tabletti / 4 kg 12 tunnin välein seuraavan taulukon mukaisesti:

Paino (kg)	Tablettia 2 x vrk	Paino (kg)	Tablettia 2 x vrk
> 1,0-2,0	½	> 4,0-6,0	1½
> 2,0-4,0	1	> 6,0-8,0	2

50 mg/12,5 mg: 1 tabletti / 5 kg 12 tunnin välein seuraavan taulukon mukaisesti:

Paino (kg)	Tablettia 2 x vrk	Paino (kg)	Tablettia 2 x vrk
> 1,3-2,5	½	> 5,1-7,5	1½
> 2,6-5,0	1	> 7,6-10,0	2

400 mg/100 mg: 1 tabletti / 40 kg 12 tunnin välein seuraavan taulukon mukaisesti:

Paino (kg)	Tablettia 2 x vrk	Paino (kg)	Tablettia 2 x vrk
> 15,0-20,0	½	> 40,0-60,0	1½
> 20,0-25,0	Käytät 200/50 mg tabl	> 60,0-80,0	2
> 25,0-40,0	1		

Vaikeissa tapauksissa voidaan eläinlääkärin harkinnan mukaan käyttää kaksinkertaista annosta: 20 mg amoksisilliiniä / 5 mg klavalanaanhappoa / kg kahdesti vuorokaudessa.

Hoidon kesto

Tavanomaisissa tapauksissa vaste saavutetaan yleensä 5–7 hoitovuorokauden kuluessa. Kroonisissa tapauksissa suositellaan pitkäkeisempaa hoitoa. Tällöin eläinlääkäri määrittää hoidon kokonaiskeston, jonka on kuitenkin oltava riittävä varmistamaan bakteeriperäisen taudin täydellisen paranemisen. Oikean annostuksen varmistamiseksi eläimen paino on määritettävä mahdollisimman tarkasti.

ANNOSTUSOHJEET

Purutabletit sisältävät makuaineita, ja useimmat kissat ja koirat ottavat ne. Purutabletit voidaan antaa suoraan eläimen suuhun tai lisätä pienen määrään ruokaa.

SÄILYTYSTÄ KOSKEVAT ERITYISET VAROTOIMET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville. Älä säilytä yli 25 °C. Jaetut tabletit on säilytettävä läpipainopakkauksessa. Jaetutjuon tablettien käyttämättömät osat on hävitettävä 12 tunnin kuluessa. Älä käytä tätä eläinlääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu läpipainopakkauksessa ja pahvikotelossa merkinnän Exp. jälkeen. Viimeisellä käyttöpäivämäärällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

ERITYISET VAROITIMET HÄVITTÄMISELLE

Lääkkeitä ei saa kaataa viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Eläinlääkkeiden tai niiden käytöstä syntyvien jätemateriaalien hävittämisessä käytetään paikallisia palauttamisjärjestelyjä sekä kyseessä olevaan eläinlääkkeeseen sovellettavia kansallisia keräysjärjestelmiä. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan suojella ympäristöä. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkärintäsi tai apteekista.

ELÄINLÄÄKKEIDEN LUOKITTELU

Eläinlääkemääräys

MYNTILUVIEN NUMEROT JA PAKKAUSKOOT

MTrn: 40mg/10 mg: 28971, 50 mg/12,5 mg: 28972, 400 mg/100 mg: 28974.

Pakkauskoost:

40 mg/10 mg: Pahvikotelo, jossa 1 läpipainopakkaus, jossa 10 tablettia. Pahvikotelo, jossa 24 läpipainopakkausta, joissa kussakin 10 tablettia.

50 mg/12,5 mg: Pahvikotelo, jossa 1 läpipainopakkaus, jossa 10 tablettia. Pahvikotelo, jossa 10 läpipainopakkausta, joissa kussakin 10 tablettia.

400 mg/100 mg: Pahvikotelo, jossa 3 läpipainopakkausta, joissa kussakin 4 tablettia. Pahvikotelo, jossa 24 läpipainopakkausta, joissa kussakin 4 tablettia.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTETTA ON VIIMEKSI

TARKISTETTU

01.06.2025

Tätä eläinlääkettä koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla unionin valmistetietokannassa (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>)

YHTEYSTIEDOT

Myyntiluvan haltija ja yhteystiedot epäillyistä haittatapahtumista ilmoittamista varten:

Ceva Santé Animale
8 rue de Logrono
33500 Libourne
Ranska
Puh: +400 35 22 11 51
Sähköposti: pharmacovigilance@ceva.com

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Ceva Santé Animale
Boulevard de la Communiction
Zone Autouroutière
53950 LOUVERNE
Ranska

Lisätietoja tästä eläinlääkkeestä saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

VET MEDICAL ANIMAL HEALTH OY

PL 27, FI-13721 PAROLA

PAKKAUSSELOSTE

Kesium® 200 mg / 50 mg purutabletit koiralle

Kesium® 500 mg / 125 mg purutabletit koiralle

ELÄNLÄÄKKEEN NIMI

Kesium 200 mg / 50 mg purutabletit koiralle
Kesium 500 mg / 125 mg purutabletit koiralle

KOOSTUMUS

Yksi tabletti sisältää:

Vaikuttavat aineet:

Amoksisilliini.....200,00 mg tai 500, 00 mg
(amoksisilliinihiydraattina)
Klavaluanihappo.....50,00 mg tai 125,00 mg
(klaviumklavulaaninaattina)

Neliapilan mallinen, jakouurrettu, beige purutabletti. Tabletti voidaan jakaa neljään yhtä suureen osaan.

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira

KÄYTTÖAIHEET

Seuraavien infektioiden hoitoon, kun aiheuttajana on amoksisilliiniin ja klavulaanihapon yhdistelmälle herkkä, beetalaktamaasia tuottava bakteerikanta ja kun eläinlääke on kliinisen kokemuksen ja/tai herkkyysmäärityksen mukaan ensisijaislääke:

- Infektioit (myös pinnallinen ja syvä märkinen ihotulehdus), kun taudin aiheuttaja on *Staphylococcus* spp.
- Virtsatielulehdukset, kun taudin aiheuttaja on *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli* tai *Proteus mirabilis*.
- Hengitystieinfektioit, kun taudin aiheuttaja on *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp tai *Pasteurella* spp.
- Ruoansulatuskanavan infektiot, kun taudin aiheuttaja on *Escherichia coli*.
- Suuontelon (limakalvojen) infektiot, kun taudin aiheuttaja on *Pasteurella* spp, *Streptococcus* spp tai *Escherichia coli*.

VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, muille beetalaktamaasille tai apuaineille. Ei saa käyttää eläimillä, joilla on vaikea muunaisten vajaatoiminta ja virtsaamatonuus tai vähävirtsaisuus. Ei saa käyttää gerbilieillä, marsuilla, hamstereilla, kaniineilla eikä chinchilloilla. Ei saa käyttää hevosilla eikä märehtijöillä. Ei saa käyttää tilanteissa, joissa tiedetään olevan resistenssiä kyseiselle yhdistelmälle.

ERITYISVAROITUKSET

Erityiset varoitukset, jotka liittyvät

turvalliseen käyttöön kohde-eläinlajeilla:

Laajakirjoisia antibioottihoitoja koskevat viranomaisohjeet, alueelliset ja kansalliset ohjeet on otettava huomioon. Älä käytä tapauksissa, joissa aiheuttajabakteeri on herkkä kapeakirjoisille penisilliineille tai pelkälle amoksisilliinille. Asianmukaista herkkyysmääritystä suositellaan hoitoa aloitettaessa, ja hoidon jatkamista suositellaan vain, kun taudinaiheuttajan herkkyys yhdistelmälle on varmistettu.

Valmisteyhteenvendon ohjeista poikkeava käyttö saattaa johtaa amoksisilliiniin ja klavulaaniin yhdistelmälle resistenttien bakteerien esiintyvyyden lisääntymiseen ja heikentää muiden beetalaktamiantibioottien tehoa.

Maksan ja muunaisten vajaatoiminnassa annosten on arvioitava huolellisesti, ja valmisteen käyttöön on perustuttava eläinlääkärin tekemään hyöty-riskiarviointiin.

Muiden kuin kohdassa Vasta-aiheet mainittujen pienten kasvinsyöjien hoitossa on noudatettava varovaisuutta. Muiden penisilliiniyhdistännäisten tai kefalosporiiniin käyttöön liittyvien allergisten ristireaktioiden mahdollisuus on otettava huomioon. Purutabletit sisältävät makuaaineita. Jotta eläimet eivät vahingossa syö tabletteja, on ne säilytettävä eläinten ulottumattomissa.

Erityiset varoimenpiteet, joita eläinlääkettä

eläimille antavan henkilön on noudatettava:

Penisilliiniin ja kefalosporiiniin itseensä pistäminen, hengittäminen, ottaminen suun kautta tai joutuminen iholle voi aiheuttaa yliherkkyyttä (allergiaa). Yliherkkyys penisilliineille voi aiheuttaa ristireaktioita kefalosporiineille ja päinvastoin. Näiden aineiden aiheuttamat allergiset reaktioit voivat joskus olla vakavia.

Älä käsittele tätä eläinlääkettä, jos tiedät olevasi herkistynyt sille tai jos sinua on kehoitettu välttämään tällaisten valmisteen käsittelyä. Käsittele eläinlääkettä hyvin varovaisesti, jotta et altistuisi sille, ja huolehdi kaikista suositelluista varotoimista. Jos sinulle kehityy altistuksen jälkeä oireita, esimerkiksi ihotummaa, käänny lääkärin puoleen ja näytä hänelle tämä varoitus. Kasvojen, huulten tai silmien alueen turvotus tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita ja vaativat kiireellistä lääkärin hoitoa. Pese kädet käytön jälkeen.

Tiineys ja laktatio:

Laboratoriotutkimuksissa rotalla ja hiirellä ei ole löydetty epämuodostumia aiheuttavista, sikiötoksista tai emälle toksisista vaikutuksista. Tiineyden ja imetyksen aikana valmistetta voidaan käyttää ainoastaan hoitavan eläinlääkärin tekemään hyöty-riskiarviointin perusteella.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Kloramfenikoli, makrolidit, sulfonamidit ja tetra-sykliinit saattavat estää penisilliiniin antibakteerisen vaikutuksen, sillä niiden bakterioostaattinen vaikutus alkaa nopeasti. Penisilliiniin saattavat voitistaa aminoglykosidien vaikutusta.

Yliannostus:

Yliannostustapauksessa saattaa esiintyä ripulia, allergisia reaktioita tai muita oireita kuten keskushermoston kiihottumisoireita tai kouristuksia. Oireenmukainen hoito aloitetaan tarvittaessa.

HAITTATAPAHUMAT

Koira:

Hyvin harvinainen (< 1 eläin 10 000 hoidetusta eläimestä, yksittäiset tapaukset mukaan luettuina):

Ruoansulatuskanavan oireita (ripulia ja oksentelua) ¹
Allergisia reaktioita (ihoreaktioita, anafylaksia) ²

¹ Hoito voidaan lopettaa haittavaikutusten vaikeusasteen ja eläinlääkärin tekemään hyöty-riskiarviointin perusteella.

² Näissä tapauksissa valmisteen käyttö on loppettava ja annettava oireenmukaista hoitoa.

Haittatapahtumista ilmoittaminen on tärkeää. Se mahdollistaa eläinlääkkeen turvallisuuden jatkuvan seurannan. Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä, että lääke ei ole tehonnut, ilmoita ensisijaisesti asiasta eläinlääkärillesi. Voit ilmoittaa kaikista haittavaikutuksista myös myyntiluvun haltijalle käyttämällä tämän pakkausselosteen lopussa olevia yhteyshenkilöitä tai kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea www-sivusto: [https://www.fimea.fi/](https://www.fimea.fi) eläinlaakkeet/

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT

KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Suun kautta. Suositusannos koirille on 10 mg amoksisilliiniä / 2,5 mg klavulaanihappoa painokiloa kohti kahdesti vuorokaudessa suun kautta, eli **200 mg/50 mg**: 1 tabletti / 20 kg 12 tunnin välein seuraavan taulukon mukaisesti:

Paino (kg)	Tabletti 2 x vrk	Paino (kg)	Tabletti 2 x vrk
> 2,6-5,0	¼	> 20,1-25,0	1¼
> 5,1-10,0	½	> 25,1-30,0	1½
> 10,1-15,0	¾	> 30,1-35,0	1¾
> 15,1-20,0	1	> 35,1-40,0	2

500 mg / 125 mg: 1 tabletti / 50 kg 12 tunnin välein seuraavan taulukon mukaisesti:

Paino (kg)	Tabletti 2 x vrk	Paino (kg)	Tabletti 2 x vrk
> 9,0-12,5	¼	> 37,6-50,0	1
> 12,6-20,0	Käytä 200/50 mg tabl	> 50,1-62,5	1¼
> 20,1-25,0	½	> 62,6-75,0	1½
> 25,1-37,5	¾		

Vaikeissa tapauksissa voidaan eläinlääkärin harkinnan mukaan käyttää kaksinkertaista annosta: 20 mg amoksisilliiniä / 5 mg klavulaanihappoa / kg kahdesti vuorokaudessa.

Hoidon kesto

Tavanomaisissa tapauksissa vaste saavutetaan yleensä 5–7 hoitovuorokauden kuluessa. Kroonisissa tapauksissa suositellaan pitkäkestoisempaa hoitoa. Tällöin eläinlääkäri määrittää hoidon kokonaiskeston, jonka on kuitenkin oltava riittävä varmistamaan bakteeriperäisen

taudin täydellisen paranemisen. Oikean annostuksen varmistamiseksi eläimen paino on määritettävä mahdollisimman tarkasti.

ANNOSTUSOHJEET

Purutabletti sisältävät makuaaineita, ja useimmat koirat ottavat ne. Purutabletti voidaan antaa suoraan eläimen suuhun tai lisätä pieneen määrään ruokaa. Tabletin jakamisohejet: Aseta tabletti tasaiselle pinnalle jakouurrepuoli alaspäin (ku-pera puoli ylöspäin). Paina etuosan kärjellä tabletin keskikohtaa kevyesti suoraan alaspäin, jolloin tabletti puolittuu leveyssuunnassa. Jaa tabletti neljäsosiin painamalla toisen puoleikkaan keskikohtaa kevyesti etuosalla, jolloin puoleikka katkeaa pituussuunnassa.

SÄILYTYSTÄ KOSKEVAT ERITYISET VAROTOIMET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville. Älä säilytä yli 25 °C. Jaetut tabletit on säilytettävä lämpöainopakkausessa. Jaettujen tablettien käyttämättömät osat on hävitettävä 36 tunnin kuluessa. Älä käytä tätä eläinlääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu lämpöainopakkausessa ja pahvikotelossa merkinnän Exp. jälkeen. Viimeisellä käyttöpäivämäärällä tarkoitetaan kuuauuden viimeistä päivää.

ERITYISET VAROTOIMET HÄVITTÄMISELLE

Lääkkeitä ei saa kaataa viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Eläinlääkkeiden tai niiden käytöstä syntyvien jätemateriaalien hävittämisessä käytetään paikallisia palautusjärjestelyjä sekä kyseessä olevaan eläinlääkkeeseen sovellettavia kansallisia keräysjärjestelmiä. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan suojella ympäristöä. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäritiltä tai apteekista.

ELÄNLÄÄKKEIDEN LUOKITTELU

Eläinlääkemääräys.

MYNTILUPIEN NUMEROT JA

PAKKAUSKOOT

MTrn: 200 mg/50 mg: 28973
500 mg/125 mg: 30867

Pakkauskoot:

200 mg/50 mg: Pahvikotelo, jossa 2 lämpöainopakkausta, joissa kussakin 8 tablettia. Pahvikotelo, jossa 12 lämpöainopakkausta, joissa kussakin 8 tablettia.

500 mg/125 mg: Pahvikotelo, jossa 12 tai 96 tablettia.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN

PAKKAUSSELOSTETTA ON VIIMEKSI

TARKISTETTU

01.06.2025

Tätä eläinlääkettä koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla unionin valmistettokannassa (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

YHTEYSTIEDOT

Myyntiluvun haltija ja yhteystiedot

epäillyistä haittatapahtumista

ilmoittamista varten:

Ceva Santé Animale
8 rue de Logrono
33500 Libourne
Ranska
Puh: +800 35 22 11 51
Sähköposti: pharmacovigilance@ceva.com

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Ceva Santé Animale
Boulevard de la Communication
Zone Autoroutière
53950 LOUVERNE
Ranska

Lisätietoja tästä eläinlääkkeestä saa myyntiluvun haltijan paikalliselta edustajalta.

VET MEDIC ANIMAL HEALTH OY
PL 27, FI-13721 PAROLA