

PAKKAUSSELOSTE

Gleptosil vet. 200 mg Fe³⁺/ml injektioneste, liuos

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Ceva Santé Animale
10, av. de La
Ballastière 33500
Libourne
Ranska

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Ceva Santé Animale
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
Ranska

IZO

Strada Statale 234, Km28,200
27013 Chignolo PO (PV)
Italia

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Gleptosil vet. 200 mg Fe³⁺/ml injektioneste, liuos

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 ml sisältää:

Vaikuttava aine: Gleptoferroni vastaten 200 mg Fe³⁺.

Apuaineet: natriumkloridi, fenoli, injektionesteisiin käytettävä vesi 1 ml:aan asti.

4. KÄYTTÖAIHEET

Raudanpuutosanemian ennaltaehkäisy ja hoito.

5. VASTA-AIHEET

Ei ole.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Akuutti anafylaktinen reaktio mahdollinen porsailla varsinkin, jos emakolla on E-vitamiinin ja/tai seleenin puute. Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Sika (pikkuporsas).

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Ennalta ehkäisyyn: pikkuporsaille 1 ml lihaksensisäisesti 1.-5. elinpäivän kuluessa kertaannoksena niskalihaksistoon.

Terapeuttisesti: 1 ml lihaksensisäisesti kerta-annoksena niskalihaksistoon. Jos eläinlääkäri on määrännyt muun annoksen, sitä on noudatettava.


9. ANNOSTUSOHJEET

Avaa suojaussi vasta juuri ennen valmisteen käyttöä.

Annostelussa voidaan käyttää pakkauksessa olevaa steriiliä automaattiruiskua tai tavanomaista injektioruiskua. Steriili automaattiruisku on tarkoitettu kertakäyttöiseksi.

Ennen injisointia vedetään ihoa sormella taaksepäin kuvien 1 ja 2 osoittamalla

tavalla. Injektiokohta ihonalaiskudos lihas luu injektion jälkeen lihas



10. VAROAIKA

Nolla vrk.

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilyvyys avatussa pakkauksessa 4 viikkoa.

12. ERITYISVAROITUKSET

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Eläimiä, joiden E-vitamiinin ja seleenin taso on alhainen, ei tulisi hoitaa ennen kuin tämä puutos on korjattu. Suurten D-vitamiiniannosten (yli 50000 KY) ja rautakompleksin samanaikaista injisointia ei suositella kalsiumshokki vaaran vuoksi.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava: Jos vahingossa injisoiit itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä pakkausselostetta tai myyntipäällystä.

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käytetty automaattiruisku hävitetään. Käyttämättä jäänyt lääke palautetaan apteekkiin hävitettäväksi. Tyhjä pakkaus ja käytetty automaattiruisku talousjätteisiin.

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSIHYVÄKSYTTY

16.04.2020

15. MUUT TIEDOT

Pakkauskoot

Pahvikotelo, jossa on yksi 100 ml:n LDPE-injektiopullo

Pahvikotelo, jossa on yksi 100 ml:n monikerroksisesta muovista valmistettu injektiopullo

Pahvikotelo, jossa on yksi 250 ml:n monikerroksisesta muovista valmistettu injektiopullo

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla

